

Protein Molecular Weight Marker (High)

Code No. 3451Q

包装量: 50 lanes

浓度: 10 µg/µl

附带 Buffer:

5X Loading Buffer 250 µl
1 M DTT (Dithiothreitol) 25 µl

制品说明:

Protein Molecular Weight Marker (High) 是由五种纯化好的不同分子量的蛋白质组成的, 它的分子量范围为: 44.3 KDa~200 KDa。进行聚丙烯酰胺凝胶电泳后, 经考马斯亮蓝 R-250 染色后的各种蛋白质的条带强度均一。

将本制品稀释20倍后进行聚丙烯酰胺凝胶电泳, 以每个泳道取5 µl (for SDS-PAGE mini gel) 电泳计算时, 本制品约可使用50次。

贮存 Buffer:

50 mM Tris-HCl, pH6.8
1 mM EDTA
200 mM NaCl
50% Glycerol

制品中的各种蛋白质种类

蛋白质种类	来源	MW (Da)
肌球蛋白	猪	200,000
β 半乳糖苷酶	大肠杆菌	116,000
磷酸酶 b	兔子肌肉	97,200
牛血清蛋白	牛	66,409
卵清蛋白	鸡蛋蛋白	44,287

保存:

Protein Molecular Weight Marker 和 1 M DTT 可在-20°C下保存。

5X Loading Buffer 使用后于室温保存。

5X Loading Buffer (开封后室温保存):

200 mM Tris-HCl, pH6.8
10% SDS
0.05% BPB
50% Glycerol

使用例:

1. 首先按以下方法配制“稀释液”。

1 M DTT	2 µl
5X Loading Buffer	20 µl


2. 按以下方法稀释本制品。

Protein MW Marker (high)	5 µl
稀释液	22 µl
灭菌水	73 µl

* 20 倍的制品稀释液可在-20°C下保存 2~3 个月, 但应避免多次反复冻融。如果一次稀释量较多时, 可以小量分装后在-20°C下保存, 以避免反复冻融。

- 20 倍稀释样品混匀后, 100°C加热处理 5 分钟, 然后取每个泳道 5 µl 进行 7.5~10.5%的聚丙烯酰胺凝胶电泳 (for SDS-PAGE mini gel)。
- 经考马斯亮蓝 R-250 染色后的结果如下。

电泳结果图 (7.5% SDS-PAGE)



使用注意:

推荐使用 7.5~10.5%的聚丙烯酰胺凝胶。浓度太高, 高分子量的蛋白分离效果不好, 有可能聚集于分离胶的上部。

注意

本产品仅供科学研究使用, 不能用于人、动物的医疗或诊断程序, 不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

未经Takara Bio Inc.书面许可授权或批准, 不得制造、许诺销售、销售、进口Takara产品, 或者使用Takara产品所有的相关专利及相关商标。

如果您需要其他用途的许可授权, 请联系我们, 或访问我们网站 www.takarabio.com。

您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。

所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

本文件由宝日生物技术(北京)有限公司翻译制作, 最新版本文件请参考 Takara Bio Inc.网站。为正确使用 Takara 产品, 您应当掌握本产品的相关知识和使用说明。

v202105Da